



ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช

กลุ่มอารักขาพืช

สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี

กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๗ ประจำวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗

หนอนใยผัก

รูปร่างลักษณะ

เป็นศัตรูที่สำคัญของพืชผักตระกูลกะหล่ำ หนอนสีเขียวอ่อน ลำตัวยาว หัวแหลมท้ายป้าน ส่วนท้ายมีปุ่มยื่นออกเป็น 2 แฉก กัดกินใบผักจนเป็นรูพรุน เมื่อถูกตัวหนอน จะดิ้นและชักใยทั้งตัวลงดิน ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็กสีน้ำตาล เมื่อหุบปีกจะเห็นลายสีขาวบนหลังเหมือนจีเพชร เป็นที่มาของชื่อสามัญ “diamond-back moth”

พืชอาหาร : ตระกูลกะหล่ำ เช่นคะน้า กวางตุ้ง ผักกาดขาว กะหล่ำปลี ฯลฯ

ลักษณะการทำลาย

ตัวเต็มวัยวางไข่เป็นฟองเดี่ยว หรือติดกัน 2 – 3 ฟอง หนอนที่ฟักออกมากัดกินใบบริเวณระหว่างเส้นเวน จนเป็นรูพรุน



หนอน



ตัวเต็มวัย

การแพร่กระจายและฤดูกาลระบาด

ในประเทศไทยพบทั่วทุกภาคที่มีการปลูกผักตระกูลกะหล่ำ โดยพบระบาดตามแหล่งปลูกเพื่อการค้า หนอนใยผักมักจะเริ่มระบาดมากตั้งแต่ฤดูหนาว และจะเพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนระบาดมากในช่วงท้ายของฤดูหนาวต่อฤดูแล้ง ซึ่งเป็นระยะที่มีการปลูกผักกันมาก ในฤดูฝนพบระบาดบ้างแต่ไม่รุนแรง